CIPRIN®

***Antidiabétique* oral**

Dans quel cas le médicament CIPRIN® est-il prescrit ?

Ce médicament est un *antidiabétique* oral qui appartient à la famille des *sulfamides* hypoglycémiants. Il permet de diminuer l'excès de sucre dans le sang en favorisant la sécrétion de l'*insuline*.

Il est utilisé dans le traitement du *diabète* de type 2 lorsque le régime alimentaire seul est insuffisant.

Présentations du médicament CIPRIN®

CEPRIN® 5 mg : comprimé ; boîte de 60
CEPRIN® 2,5 mg : comprimé ; boîte de 60

Composition du médicament CIPRIN®

	p cp	p cp
Glibenclamide	5 mg	2,5 mg

Contre-indications du médicament CIPRIN®

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- *allergie* aux *sulfamides*,
- *insuffisance rénale* ou hépatique grave,
- *porphyrie*,
- en association avec les médicaments contenant du miconazole,

- **allaitement**.
- Il faut se référer à la notice de l'emballage pour tout effet notoire d'un des excipients du médicament.

Attention

Ce médicament n'est pas adapté au traitement du *diabète* de type 1 : celui-ci requiert un traitement par injections d'*insuline*.

Un sentiment de malaise associé à des sueurs froides, une fringale, une accélération du cœur sont les signes habituels d'une *hypoglycémie* due à un effet excessif du médicament. Cette *hypoglycémie* peut également se traduire par des troubles du comportement, qui doivent alerter votre entourage, voire des *convulsions* ou un *coma*. En présence de ces signes ou en cas de simple doute, buvez une boisson sucrée ou mangez du *sucre*. Si le diabétique est inconscient, surtout ne lui donnez rien à boire et appelez votre médecin ou à défaut le 15 ou un service d'urgence.

Consultez rapidement votre médecin en cas de malaises hypoglycémiques répétés.

Certaines situations peuvent contribuer à augmenter la *glycémie* : infections, prise de médicaments, stress. En cas de soif intense, de grande fatigue, de sensation de malaise général, consultez rapidement votre médecin.

Des analyses de sang régulières permettent à votre médecin d'adapter la *posologie*. Dans certains cas, il peut être nécessaire de pratiquer vous-même des contrôles, à l'aide de bandelettes et d'un appareil lecteur de glycémie.

Évitez la prise de boissons alcoolisées pendant le traitement : risque accru d'*hypoglycémie* et risque d'effet *antabuse*.

Conducteur : une *hypoglycémie* peut entraîner un malaise pendant la conduite ou l'utilisation de machines.

Interactions du médicament CIPRIN® avec d'autres substances

Ce médicament ne doit pas être associé avec les médicaments oraux contenant du miconazole: risque d'*hypoglycémie*.

Il peut interagir avec les médicaments contenant de la phénylbutazone ou du danazol.

Informez par ailleurs votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez un *bêtabloquant*, un inhibiteur de l'*enzyme* de conversion, un *corticoïde*, ou un médicament contenant du fluconazole, de la desmopressine, de la ritodrine, du salbutamol, de la terbutaline ou de la chlorpromazine.

Fertilité, grossesse et allaitement

Grossesse :

Un *diabète* mal équilibré peut être néfaste pour l'enfant à naître. Un désir de grossesse nécessite le remplacement de ce médicament par de l'*insuline* et une surveillance médicale renforcée. Si une grossesse survient alors que vous êtes encore sous traitement *antidiabétique* oral, consultez rapidement votre médecin pour un passage à l'*insuline* injectable.

Allaitement :

Les données disponibles ne permettent pas de savoir si ce médicament passe dans le lait maternel : il est contre-indiqué en cas d'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament CIPRIN®

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau, avant les repas.

Posologie usuelle :

> La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais de la réaction de chacun.
>
> Seul le médecin peut la définir.

Suivre attentivement la prescription de votre médecin. Le régime alimentaire reste nécessaire pendant le traitement.

Conseils

Le respect de certaines règles simples permet de diminuer le risque d'*hypoglycémie* :

- toute prise de ce médicament doit être suivie d'un repas (ne prenez pas de comprimé si vous devez sauter le repas suivant) ;
- si vous envisagez un effort physique intense et prolongé, il peut être nécessaire de diminuer la dose du médicament (demandez conseil à votre médecin) ;
- informez votre médecin si vous devez travailler la nuit ou si votre religion vous impose un jeûne prolongé ;
- évitez la prise de boissons alcoolisées à jeun ou à distance des repas.

Le *diabète* peut diminuer la sensibilité des pieds à la douleur et favoriser les infections. Des plaies profondes peuvent se développer : une hygiène rigoureuse et des chaussures confortables limitent ce risque.

Le régime du diabétique ne consiste pas en une simple interdiction des *glucides* (sucres, pain, pâtes...) : demandez conseil à votre médecin.

Pesez-vous régulièrement et signalez toute variation rapide de poids à votre médecin.

Effets indésirables possibles du médicament CIPRIN®

Hypoglycémie (voir Attention).

Troubles digestifs, démangeaisons, *éruption cutanée.*

Exceptionnellement : anomalie de la *numération formule sanguine*, augmentation des *transaminases*, jaunisse.